


































































































23 РОКИ | з любов'ю
до тварин





































Назва	Склад (в 1 мл (г) препарату)	Вид тварини
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ПРЕПАРАТИ		
Амоксивет 500® водорозчинний порошок	Амоксициліну тригідрат – 500 мг	        
Гатинол пероральний розчин	Гатифлоксацин – 50 мг; колістину сульфат – 1200000 МО; триметоприм – 50 мг	  
Гентавет 10%® пероральний розчин	Гентаміцину сульфат – 100 мг	        
Гентазимвет® водорозчинний порошок	Гентаміцину сульфат – 40 мг, сульфадимезин – 100 мг, триметоприм – 20 мг	 
Гентафлокс® пероральний порошок	Гентаміцину сульфат – 40 мг, офлоксацин – 100 мг	        
Енрофлоквет 20%® пероральний розчин	Енрофлоксацин – 200 мг	  
Колі-Окс 200® водорозчинний порошок	Колістину сульфат – 1 200 000 МО, окситетрацикліну г/г – 100 мг	        
SL-44 водорозчинний порошок	Спектиноміцин основа – 22 мг; лінкоміцин основа – 22 мг	        
МАРФЛОКС пероральний розчин	Моксифлоксацин (у форм моксифлокса- цину гідрохлориду) - 100,0 мг колістину сульфат – 2 000 000 МО.	 
Метафлокс 250 пероральний порошок	Доксицикліну гіклат – 250 мг; колістину сульфат – 2 400 000 МО	 
Метацин 50 водорозчинний порошок	Доксицикліну гіклат – 500 мг	        
Метацин Форте пероральний порошок	Доксицикліну гіклат – 500 мг; колістину сульфат – 4 800 000 МО	 
Норфлоквет 20%® пероральний розчин	Норфлоксацин – 200 мг	        
Орнитил пероральний розчин	Левовфлоксацин – 150 мг; колістину сульфат – 1 200 000 МО	        
Офлоксацинвет 10%® пероральний розчин	Офлоксацин – 100 мг	        









































Дозування	Каренція	Форма випуску
0,3-0,4 г / 10 кг м.т. або 100 г / 300 л питної води протягом 5 днів.	3 доби	1, 2, 5, 10, 50, 100, 500 г; 1, 25 кг
Перорально в дозі 0,5 мл препарату на 1 л питної води (25 мг гатифлоксацину, 600000 МО колістину, 25 мг триметоприму на 1 л питної води), що відповідає 3 мг гатифлоксацину, 72000 МО колістину, 3 мг триметоприму на 1 кг маси тіла тварини. Курс лікування – 3-5 діб. При важких формах захворювань і в разі сальмонельозу дозу збільшують на 50% і застосовують протягом 5-7 діб.	12 діб	0,5, 1, 10, 20, 50 та 100 мл
Орально – 20 мл препарату на 100 л питної води протягом 5-7 діб; аерозольна обробка – 1,5 л препарату на 8,5 л води, розпорошується за допомогою генераторів аерозолів на 5000 м³ приміщення на висоті 120-150 см від підлоги з розрахунку один «САГ-1» на 150-200 м² підлоги при висоті пташника до 4 м.	7 діб	10, 50, 100, 500 мл та 1 л
Бройлери, індички: 1 г / 2,5-2,8 кг корму або 1 кг / 2000 л питної води. Застосовують препарат з інтервалом 24 години протягом 3-5 діб.	7 діб	1, 50, 100, 500 г та 1 кг
0,5-1 г / 1 л питної води на добу протягом 3-5 діб.	7 діб	1, 10, 20, 100, 200 г, 0,5, 1 кг
Курчата, кури-бройлери, індички: 0,25-0,5 мл на 1 л питної води протягом 3-5 діб з інтервалом 24 години.	12 діб	0,5, 1, 50, 100, 500 мл та 1 л
100 г / 100-200 л питної води або 100 г / 50-100 кг корму протягом 5-7 діб.	7 діб	1, 10, 50, 100 та 500 г; 1 та 25 кг
Для профілактики – 1 кг / 1 т корму на добу протягом 5-7 діб; для лікування – 2 кг / 1 т корму (1-2 кг / 1000 л питної води), що відповідає 2,3 г / 1 кг м.т. на добу протягом 5-7 діб. При необхідності лікування продовжують до 21 доби.	2 доби	1,10, 20, 100 г; 1, 25 кг
Циплята, кури-бройлери, ремонтний молодняк курей: - 1,0 л препарату на 4000 л питної води або 5 мг моксифлоксацину на 1 кг м.т., Курс лікування – 3-5 днів.	5 діб	1000 мл
Кури-бройлери, батьківське поголів'я, ремонтний молодняк, індички – 0,8-1,0 г препарату на 10 кг маси тіла на добу (20-25 мг доксицикліну та 240 000 МО колістину сульфату на 1 кг маси тіла на добу) або 200 г препарату на 500-1000 л питної води щодоби протягом 5 діб.	7 діб	1, 2, 5, 10, 50, 100 та 500 г; 1, 20 та 25 кг
0,4-0,5 г / 10 кг м.т. на добу або 100 г / 500-1000 л питної води протягом 5 днів.	7 діб	1, 2, 5, 10, 50, 100, 500 та 1000 г; 25 кг
Бройлери, ремонтний молодняк, індички – 0,4-0,5 г / 10 кг м. т. на добу (20-25 мг доксицикліну та 192 000 МО – 240 000 МО колістину сульфату на 1 кг маси тіла на добу) або 100 г / 500-1000 л питної води протягом 5 днів.	7 діб	1, 2, 5, 10, 50, 100, 500 та 1000 г; 25 кг
1 мл / 1,5-4 л питної води на добу пртягом 3-5 діб.	14 діб	0,5, 1, 10, 20, 50, 100, 240, 1000 мл
0,5 мл на 1 л питної води протягом 3-5 діб з інтервалом 24 години.	7 діб	0,5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 240, 500 мл та 1 л
5 мл / 10 л питної води (дозу можна збільшити в 2 рази) на добу протягом 3-5 діб.	14 діб	0,5, 1, 50, 100, 240 мл; 1 л

Назва	Склад (в 1 мл (г) препарату)	Вид тварини
Параміцин пероральний розчин	Енрофлоксацин – 120 мг; колістину сульфат – 1 200 000 МО	        
Пневмосепт порошок кормовий пероральний	Спектиноміцин осн. – 22 мг; лінкоміцин осн. – 22 мг; флорфенікол – 50 мг	        
Тіамукол® водорозчинний порошок	Тіамулін основа – 450 мг; колістину сульфат – 1 200 000 МО	        
Тілміковет 25%® пероральний розчин	Тілмікозін (тілмікозіна фосфат) – 250 мг	
Тілміковет Форте® пероральний розчин	Тілмікозін – 250 мг; бромгексина гідрохлорид – 16,7 мг	
Тилоциклінвет® водорозчинний порошок	Доксицикліну гіклат – 100 мг; тилозину тартрат – 100 мг	  
Тримератинвет водорозчинний порошок	Сульфадимезин – 100 мг; триметоприм – 20 мг	 
Тримератинвет Форте водорозчинний порошок	Сульфадімеzin – 200 г; триметоприм – 40 г	 
Фловет 5%® пероральний розчин	Флорфенікол – 50 мг	 
Фловет 8%® пероральний порошок	Флорфенікол – 80 мг	 
Цефалор	Цефалексин – 250 мг	 
Ципрофлоквет 10%® пероральний розчин	Ципрофлоксацин – 100 мг	        
Ципрокол пероральний розчин	Ципрофлоксацин – 100 мг; колістину сульфат – 1 000 000 МО	     
ВЕТЕРИНАРНІ АПТЕЧКИ		
Аптечка ветеринарна Супер	Паратіл Аскорбінова кислота Декавіт Тримератінвет Ціанофор	        



























Дозування						Каренція	Форма випуску
0,5-1 мл / 1 л питної води на добу. Застосовують препарат з інтервалом 24 години, курс лікування – 5 днів.						12 діб	0,5, 1, 10 мл; 1, 5 л
1-2 кг / 1 т корму на добу протягом 5-7 діб.						7 діб	1, 10, 20, 100, 500, 1000 г; 25 кг
25-50 г / 100 л питної води за схемою.						7 діб (м'ясо) 3 доби (яйця)	0,5, 50, 100, 500 г; 1, 25 кг
Курчата: 30 мл / 100 л питної води протягом 3-х діб. Лікування можна повторити пізніше у разі стресових ситуацій та нових випадків захворювання.						12 діб	50, 100, 240, 1000 мл
Курчата: 30 мл / 100 л питної води протягом 3-х діб. Лікування можна повторити пізніше у разі стресових ситуацій та нових випадків захворювання.						8 діб	0,5, 1, 10, 20, 50, 100, 240 мл; 1, 5 л
Курчата, бройлери, індики: 1 г / 1л питної води протягом 3-5 діб. Залежно від тяжкості захворювання першу дозу препарату можна збільшити в 2 рази.						8 діб	1, 50, 100, 500 та 1000 г
Бройлери, ремонтний молодняк: 2-2,5 г / 10 кг маси тіла або 1 кг / 1000 л питної води щодня протягом 3-5 діб.						2 доби	3, 50, 100, 500 та 1000 г
Бройлери, ремонтний молодняк: 1-1,25 г / 10 кг м.т. або приблизно 0,5 кг / 1000 л питної води щодня протягом 3-5 діб. При важких випадках захворювання птахів дозу можна збільшити 0,5-1 кг / 1000 л питної води або 1000 кг корму (2,0 г / 10 кг м.т.) щодня протягом 3-5 діб. Застосовують з інтервалом 24 години.						2 доби	1, 2, 5, 10, 50, 100 г; 0,5 та 1 кг
Бройлери, племінні кури, ремонтний молодняк, індики – 20 мл / 1 кг м.т.; молодняк до 4-тижневого віку – 200 мл / 100 л питної води щодоби протягом 3-5 діб; птах старше 4-тижневого віку – 400 мл / 100 л питної води щодоби протягом 3-5 діб.						7 діб	1 л
Кури-бройлери, племінні кури, ремонтний молодняк птахів, індики – 0,5 г / 2 кг маси тіла (20 мг флорфенікола на 1 кг маси тіла) з кормом щодоби протягом 5-7 діб.						2 доби	1, 2, 5, 10, 50, 100, 500 г та 1 кг
500-600 г препарату на 1000 л питної води щодобово протягом 3-5 діб.						2 доби	1, 2, 5, 10, 50, 100, 500 г; 1, 20 та 25 кг
5 мл / 10 л питної води (дозу можна збільшити в 2 рази) на добу протягом 3-5 діб.						11 діб	0,5, 1, 100, 240, 500 та 1000 мл
С/г птахи, голуби: 0,5-1 мл / 1 л питної води на добу. Курс лікування – 3-5 діб.						10-12 діб	0,5, 1, 10, 20, 50, 100, 240 мл та 1 л
Рекомендована схема послідовності застосування препаратів:						–	Паратіл – 3 амп. по 1 мл; Аскорбінова кислота – 1 пакет – 2 г; Декавіт – 5 амп. по 1 мл; Тримератінвет – 5 пакетів по 3 г; Ціанофор – 3 амп. по 1 мл
Вік пташенят у днях	Паратіл пероральний розчин	Аскорбінова кислота порошок (на кінчику ножа)	Декавіт пероральний розчин	Тримератінвет порошок	Ціанофор пероральний розчин		
з 1 по 3	+	+	-	-	+		
з 4 по 8	-	-	+	-	-		
з 9 по 20	-	+	-	-	-		
з 21 до 25	-	+	-	+	-		

Назва	Склад (в 1 мл (г) препарату)	Вид тварини
Аптечка ветеринарна Нова	Параміцин Аскорбінова кислота Декавіт Ампролінвет	       
КОКЦИДІОСТАТИКИ		
Ампролінвет пероральний розчин	Ампроліума гідрохлорид – 125 мг	  
Декокцил гранули для перорального застосування	Декоквінат – 60 мг	
Мадуросан-ВС пероральний порошок, гранульований	Мадураміцин (у формі мадураміцин амонію) – 10 мг	 
Манибазин® гранули для перорального застосування	Мадураміцин (у формі мадураміцин амонію) – 10 мг; нікарбазін – 80 мг	 
Рейкокс пероральний порошок, мікрогранульований	Диклазуріл – 2,5 мг	    
Робезол 6,6 гранули	Робенідін – 66 мг	 
Сарінофор-ВС пероральний порошок, гранульований	Саліноміцин натрію – 120 мг	
Турил 2,5% пероральний розчин	Толтразуріл – 25 мг	 
Царекс гранули	Монензін натрію – 200 мг	 
АНТИСТРЕСОВІ ТА ВІТАМІННІ ПРЕПАРАТИ		
АСК-70 пероральний порошок	Кислота ацетилсаліцилова – 700 мг	
Гепасан-ВС	L-карнітину гідрохлорид – 25,0 мг; сорбітол – 200,0 мг; магнію сульфат гептагідрат – 50,0 мг; холіну хлорид 75% – 146,1 мг; бетаїну гідрохлорид – 25,0 мг; L-аргінін – 15,0 мг	    

Дозування					Каренція	Форма випуску
Рекомендована схема послідовності застосування препаратів:					–	Параміцин – 3 амп. по 0,75 мл; Аскорбінова кислота – 1 пакет – 2 г; Декавіт – 5 амп. по 1 мл; Ампролінвет – 5 пакетів по 2 г
Вік пташенят у днях	Паратіл пероральний розчин	Аскорбінова кислота порошок	Декавіт пероральний розчин	Ампролінвет порошок		
з 1 по 3	+	+	-	-		
з 4 по 8	-	-	+	-		
з 9 по 20	-	+	-	-		
з 21 до 25	-	+	-	+		
Бройлери, фазани, ремонтний молодняк, індики: профілактика – 1 г / 1 л питної води або корму на добу; лікування – 2 г / 1 л питної води або 1 кг корму на добу протягом 5-7 діб (3-5 діб індики).					3 доби	2, 50, 100, 500 та 1000 г; 0,5, 1, 50,100 та 500 мл; 1 л
Курчата-бройлери, ремонтний молодняк: 0,333-0,667 кг / 1 т корму, що еквівалентно 20-40 мг декоквіната / кг корму. Препарат з кормом згодовують курчатам протягом всього періоду вирощування.					3 доби	50, 100, 500 г; 1, 5, 10, 20 та 25 кг
Курчата-бройлери, ремонтний молодняк курей, індики – 0,5 кг / 1000 кг корму (еквівалентно 5 мг мадурамицину на 1 кг м.т.) бройлерам з 1-добового віку протягом усього періоду вирощування, ремонтному молодняку курей – з 1-добового віку до 16-тижневого віку.					5 діб	50, 100, 500 г; 1, 5, 10, 20 та 25 кг
Курчата-бройлери та ремонтний молодняк курей: 0,5 кг препарату (еквівалентно 5 г мадурамицину та 40 г нікарбазіну) на 1000 кг корму, бройлерам з 1-добового віку протягом всього періоду вирощування, ремонтному молодняку курей – з 1-добового віку до 16-тижневого віку.					5 діб	50, 100, 500 г; 1, 5, 10, 20 та 25 кг
Курчата-бройлери, ремонтний молодняк, індики, качки, гуси, фазани: 0,4 кг / 1 тону корму (еквівалентно 1 г діклазурілу на 1000 кг корму), бройлерам з 1-добового віку протягом усього періоду вирощування, індікам – з 1-добового віку до 14-тижневого віку, ремонтному молодняку курей, качкам, гусям, фазанам – з 1-добового віку до 16-тижневого віку.					0 діб	50, 100, 500 г; 1, 5, 10, 20 та 25 кг
Курчата-бройлери, індики: 0,450-0,545 кг / 1 тону корму (еквівалентно 30-36 мг робенідину / 1 кг корму), бройлерам з 1-добового віку протягом усього періоду вирощування, індікам – з 1-добового віку до 16-тижневого віку.					0 діб	50, 100, 500 г; 1, 5, 10, 20 та 25 кг
Курчата-бройлери, ремонтний молодняк курей у віці до 12 тижнів: 0,5 кг / 1 тону корму (еквівалентно 60 г саліноміцину / 1 тону корму).					5 діб	50, 100, 500 г; 1, 5, 10, 20 та 25 кг
Бройлери, ремонтний молодняк курей, індиків: 7 мг / 1 кг м.т. (28 мл / 100 кг м.т.), що відповідає 1 мл / 1 л води при випоюванні протягом 24 годин або 3 мл / 1 л води при випоюванні протягом 8 годин на добу дві доби поспіль.					3 доби (бройлери) 5 діб (індики)	100, 200 мл та 1 л
Курчата-бройлери, ремонтний молодняк птахів, індики: 0,5-0,6 кг препарату / 1 тону корму (еквівалентно 100-120 г монензіну натрію / 1 тону корму), бройлерам з 1-добового віку протягом усього періоду вирощування, ремонтному молодняку курей – з 1-добового віку до 16-тижневого віку.					5 діб	50, 100, 500 г; 1, 5, 10, 20 та 25 кг
Бройлери, племінні кури, ремонтний молодняк: 300-600 г / 1000 л води питної або 1000 кг корму на добу. Курс лікування – 3-5 діб.					1 доба	1, 2, 5, 10, 50, 100, 500 г; 1, 20 та 25 кг
0,5-0,75 мл/л питної води впродовж 5-10 діб.					0 діб	10, 20, 100 мл; 1, 5, 10, 20 та 25 л

Назва	Склад (в 1 мл (г) препарату)	Вид тварини
Декавіт пероральний розчин	1 мл препарату містить діючі речовини: вітамін А (ретинолу ацетат) – 10 000 МО; вітамін D3 (холекальцифрол) – 1 000 МО; вітамін Е (α-токоферолу ацетат) – 15 мг; вітамін К3 (менадіон) – 2 мг; вітамін В1 (тіаміну гідрохлорид) – 2 мг; кальцію пантотенат – 8 мг; вітамін В6 (пірідосіну гідрохлорид) – 2 мг; вітамін В12 (ціанокобаламін) – 30мг; вітамін С (аскорбінова кислота) – 20мг; L-лізін – 2,5 мг	      
Карнівет-L® пероральний розчин	L-карнітину гідрохлорид – 50 мг	        
Сетол-Е® емульсія для перорального застосування	Вітамін Е (альфа-токоферолу ацетат) – 100 мг; натрію селеніт – 1 мг	        
Ціанофор пероральний розчин	Бутафосфан – 100 мг; вітамін В12 – 0,05 мг	
КОРМОВІ АНТИБІОТИКИ (ТІЛЬКИ ДЛЯ ЕКСПОРТУ ДО КРАЇН МИТНОГО СОЮЗУ)		
Медицилат® гранули	Бацитрацин метилен дісаліцилат – 150 мг	        
Рікоцин® пероральний порошок, гранульований	Енраміцин – 40 мг	        
ЗІНОЛ® пероральний порошок, гранульований	Нозигептид — 10 мг	  
АДСОРБЕНТИ		
Бентотокс пероральний порошок	100 г кормової добавки містить: бентоніт – 50 г; каолін – 5 г; сухі дріжджі (Saccharomyces cerevisiae) – 32,5 г; бура водорість – 5 г; кальцію пропіонат – 5 г; лимонна кислота – 2,5 г	        

Дозування	Каренція	Форма випуску
Перорально з питною водою щодоби у дозі на 1 літр питної води протягом 3-8 діб: кури, індики, качки, перепела, батьківське поголів'я – 0,5 мл; курчата, бройлери, індичата, каченята, перепелята до 21-добового віку та ремонтний молодняк – 0,5 мл; декоративний птах – 0,5 мл.	0 діб	0,5, 1, 10 та 100 мл; 1, 5 л
Добавка до щоденного раціону у дозах: 1-2 мл / 1 л питної води протягом 5-10 діб. Не застосовувати більше ніж 21 день.	0 діб	10, 20, 100 мл; 1 та 5 л
1 л / 4000 л питної води протягом 3-5 діб; курчата (до 21-добового віку) – 1 л / 1000-2000 л питної води протягом 3-5 діб.	0 діб	10, 20, 50, 100, 200 мл; 1 та 5 л
Кури-несучки, бройлери після 4-х тижнів: 2-3 мл / 1 л питної води протягом 4-5 днів. Курчата, ремонтний молодняк, бройлери до 4-х тижнів: 1-1,5 мл / 1 л питної води протягом 4-5 днів.	0 діб	1000 мл
Перед використанням препарат змішують з готовим кормом в наступних дозах: курчата-бройлери та ремонтний молодняк – 27-330 г/тонну; кури-несучки – 67-165 г/тонну; індики на дорощуванні, фазани – 27-330 г/тонну; перепела, голуби – 30-130 г/тонну.	0 діб	100, 500 г; 1, 5, 10, 20 та 25 кг
Перорально з готовим кормом у дозі 0,125-0,250 г препарату / 1 кг корму протягом 5-7 діб. У разі потреби курс лікування можна повторити.	0 діб	100, 500 г; 1, 5, 10, 20 та 25 кг
0,250-0,300 кг на тону протягом 5-7 діб. Корм з препаратом повинен бути єдиним джерелом годівлі протягом всього періоду застосування препарату! За необхідності курс лікування може бути повторений.	0 діб	1, 10, 50, 100 г
Кормову добавку вносять до корму шляхом рівномірного змішування з розрахунку рівня контамінації мікотаксінами: при низькій – 0,5-1 кг на 1 тону корму; при середній та високій – 1-2 кг на 1 тону корму.	–	50, 100, 500 г; 1, 5, 10, 20 та 25 кг

Назва	Склад (в 1 мл (г) препарату)	Вид тварини
Цеотокс пероральний порошок	100 г кормової добавки містить: цеоліт – 55 г; каолін – 15 г; сухі дріжджі (<i>Saccharomyces cerevisiae</i>) – 10г; фумарова кислота – 10 г; кальцію пропіонат – 5 г; лимонна кислота – 5 г	        
Вітамнан пероральний порошок	100 г містить: фракція інактивованих дріжджових клітин <i>Saccharomyces cerevisiae</i> з вмістом висушених клітинних стінок – 90 г ; алюмосилікат або суміш алюмосилікатів -10,0 г.	    
ПІДКИСЛЮВАЧІ		
Бакцинол пероральний розчин	Кислота мурашина (E236) – 570 мг; кислота пропіонова (E280) – 150 мг; кальцію пропіонат (E282) – 100 мг; кислота молочна (E270) – 100 мг; кислота лимонна (E330) – 25 мг; кислота оцтова (E260) – 10 мг; кислота бурштинова – 5 мг	
ГЕПАТОПРОТЕКТОРИ		
Гепасан-ВС пероральний розчин	L-карнітину гідрохлорид – 25,0 мг; сорбітол – 200 мг; магнію сульфат гептагідрат – 50 мг; холіну хлорид 75% – 219,2 мг; бетаїн гідрохлорид – 50 мг; L-аргінін – 15 мг	        
ПРОБІОТИКИ		
Активіл-3 порошок для перорального застосування	1 кг пробіотичної кормової добавки містить: <i>Clostridium butyricum</i> -1×10 ⁹ КУО /кг; <i>Bacillus licheniformis</i> -1×10 ¹² КУО/ кг; <i>Bacillus subtilis</i> – 1 × 10 ¹² КУО/кг. Загальна кількість бактерій: <i>Bacillus</i> – 2 × 10 ¹² КУО/кг; <i>Clostridium</i> – 1 × 10 ⁹ КУО/кг	
СТИМУЛЯТОРИ ДИХАЛЬНОГО ЦЕНТРУ, МУКОЛІТИКИ, ВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ		
Броменгіл пероральний розчин	Бромгексину гідрохлорид – 20 мг; ментол – 8 мг	

Дозування	Каренція	Форма випуску
Кормову добавку вносять до корму шляхом рівномірного змішування з розрахунку: при ураженні корму мікотоксинами: 0,5-2 кг на 1 тонну корму в залежності від ступеня забруднення.	—	50, 100, 500 г; 1, 5, 10, 20 та 25 кг
Кормову добавку вносять у корм шляхом рівномірного змішування із розрахунку рівня контамінації мікотоксинами: - 0,8 – 1,2 кг/т корму.	—	50, 100, 500 г; 1, 5, 10, 20 та 25 кг
Бакцинол розпилюють на корм при змішуванні або згодують з кормом шляхом ступеневого змішування або додають в питну воду з розрахунку: корм – 1-3 л добавки на 1000 кг; питна вода – 0,3-1 л добавки на 1000 л; для дезінфекції та очищення системи подачі води – 0,5% розчин додають в систему подачі води на 12 годин. Після застосування промивають холодною водою; профілактика сальмонельозу – (0,1-0,3)%. Доза залежить від рівня бактеріального фону, складу корму та якості питної води.	—	50, 100 г; 1, 5, 10, 20 та 25 кг
Застосовують перорально протягом 5-10 діб у дозах: 0,5-1 мл кормової добавки на 1 літр питної води.	0 діб	10, 20 та 100 мл
Дозування при змішуванні з кормом: бройлери, несучки – 100-200 г/т. Дозування при змішуванні з водою: бройлери, несучки – 50-100 г/т.	—	50, 100, 500 та 1 кг
Бройлери, ремонтний молодняк птахів: 1 мл препарату на 8 л питної води протягом 3-5 діб.	1 доба	0,5, 1, 50, 100 мл; 1 та 5 л



Україна, м. Харків, вул. Смольна, 30

Тел.: +38 /057/ 714-37-51

e-mail: info@vetsintez.com

 vetsintez.com.ua

 [VetsintezGroup](https://www.facebook.com/VetsintezGroup)